
ABVD 療法

【癌種】 ホジキンリンパ種

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 6～8 コース

薬剤	投与時間	1 日目		15 日目		28 日目
ドキシソルピシン (アドリアシン®) 25mg/m ²	30 分	↓		↓		
プレオマイシン (プレオ®) 10mg/m ²	5 分	↓		↓		
ビンブラスチン (エクザール®) 6mg/m ² ※最大 10mg	5 分	↓		↓		
ダカルバジン 375mg/m ²	1 時間	↓		↓		

【注意点】

悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、血管炎、脱毛、心機能障害、肺障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

Nivolumab 療法

【癌種】 ホジキンリンパ種

【1 コース期間】 14 日

【コース数】 なし

薬剤	投与時間	1日目	14日目
ニボルマブ (オプジーブ®) 240mg/body	1 時間	↓	

【注意点】

間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象(irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。

Brentuximab vedotin 単独療法

【癌種】 ホジキンリンパ種

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 なし

薬剤	投与時間	1 日目	14 日目
ブレンツキシマブ ベドチン (アドセトリス®) ※1.8mg/kg	1 時間	↓	

※体重が 100kg を超える場合には、100kg として計算

【注意点】

Infusion reaction や末梢神経障害、間質性肺炎、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

A-AVD 療法

【癌種】 ホジキンリンパ種

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 6～8 コース

薬剤	投与時間	1 日目	15 日目	28 日目
ブレンツキシマブ ベドチン (アドセトリス®) 1.2mg/kg	1 時間	↓	↓	
ドキシソルピシン (アドリアシン®) 25mg/m ²	30 分	↓	↓	
ビンブラスチン (エクザール®) 6mg/m ² ※最大 10mg	5 分	↓	↓	
ダカルバジン 375mg/m ²	1 時間	↓	↓	

【注意点】

悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、血管炎、脱毛、心機能障害、肺障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院へ連絡して下さい。

中部徳洲会病院 薬剤部
TEL : 098-932-1110 (代表)
FAX : 098-923-2134 (薬剤部直通)