

---

## Modified LSG15 (VCAP-AMP-VECP) 療法

---

【癌種】成人 T 細胞性白血病

【1 コース期間】28 日

【コース数】VCAP→AMP→VECP を 28 日毎 1 コースとし 6 コース

### VCAP 療法

薬剤	投与時間	1 日目	7 日目
ドキソルビシン (アドリアシン®) 40mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	
ビンクリスチン (オンコビン®) 1mg/m <sup>2</sup> ※最大 2mg	5 分	↓	
シクロホスファミド (エンドキサン®) 350mg/m <sup>2</sup>	2 時間	↓	
プレドニゾン 40mg/m <sup>2</sup>	内服	→	

### AMP 療法

薬剤	投与時間	8 日目	14 日目
ドキソルビシン (アドリアシン®) 30mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	
ラニムスチン (サイメリン®) 60mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	
プレドニゾン 40mg/m <sup>2</sup>	内服	→	

## VECP 療法

薬剤	投与時間	15 日目	16 日目	17 日目	28 日目
フィルデシン (ビンデシン®) 2.4mg/m <sup>2</sup> ※最大 3mg	30 分	↓			
エトポシド (ラステット®) 100mg/m <sup>2</sup>	1 時間	↓	↓	↓	
カルボプラチン (パラプラチン®) 250mg/m <sup>2</sup>	2 時間	↓			
プレドニゾロン 40mg/m <sup>2</sup>	内服	→			

### 【注意点】

悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、血管炎、脱毛、心機能障害、肺障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

---

---

## Mogamulizumab 単独療法

---

【癌種】成人 T 細胞性白血病

【1 コース期間】7 日

【コース数】8 コース

薬剤	投与時間	1 日目	7 日目
モガムリズマブ (ポテリジオ®) 1mg/kg	2 時間	↓	

【注意点】

infusion reaction、皮膚障害などの有害事象が起こる可能性があります。

---

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院へ連絡して下さい。

中部徳洲会病院 薬剤部  
TEL : 098-932-1110 (代表)  
FAX : 098-923-2134 (薬剤部直通)