

---

## S-1 単独療法

---

【癌種】 膵臓癌

【区分】 術後補助

【1 コース期間】 42 日 (TS-1<sup>®</sup>は 28 日間内服、14 日間休薬)

【コース数】 4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	28 日目
テガフル・ ギメラシル・ オテラシル カリウム配合 (TS-1 <sup>®</sup> )	40mg/m <sup>2</sup> /回 1 日 2 回	連日内服	→		

薬剤名	29 日目	～	42 日目
テガフル・ ギメラシル・ オテラシル カリウム配合 (TS-1 <sup>®</sup> )	休薬	～	休薬終了

### 【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## GEM 単独療法

---

【癌種】 膵臓癌

【区分】 術後補助

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 6 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
ゲムシタビン (ジェムザール®)	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	↓	↓	～	↓

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## GEM 単独療法

---

【癌種】 膵臓癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
ゲムシタビン (ジェムザール®)	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	↓	↓	～	↓

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## FOLFIRINOX 療法

---

【癌種】 膵臓癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 14 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	14 日目
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2 時間	↓		
イリノテカン (カンプト®)	150mg/m <sup>2</sup>	90 分	↓		
オキサリプラチン (エルプラット®)	85mg/m <sup>2</sup>	2 時間	↓		
フルオロウラシル (5-FU®)	400mg/m <sup>2</sup>	5 分	↓		
フルオロウラシル (5-FU®)	2400mg/m <sup>2</sup>	46 時間	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## GEM+nab-PTX 療法

---

【癌種】 膵臓癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
ゲムシタビン (ジェムザール®)	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	↓	↓		
パクリタキセル アルブミン懸濁型 (アブラキサン®)	125mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

---

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部

[TEL 098-932-1110](tel:098-932-1110) (代表)

FAX 098-923-2134 (薬剤部)