
CDDP+VNR 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】術後補助

【1 コース期間】21 日

【コース数】4~6 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	8日目	～	21日目
シスプラチニン (ランダ®)	80mg/m2	90分	↓			
ビノレルビン (ロゼウス®)	25mg/m2	5分	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

CDDP+PEM±BV 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	21日目
ベバシズマブ (アバスチン®)	15mg/kg	※90 分	↓		
シスプラチニ (ランダ®)	75mg/m2	90 分	↓		
ペメトレキセド (アリムタ®)	500mg/m2	10 分	↓		

※アバスチンは初回投与が問題なければ、2回目は 60 分、3回目以降は 30 分に短縮可能。

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。
-

PEM±BV 維持療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】なし

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	21日目
ベバシズマブ (アバスチン®)	15mg/kg	※90分	↓		
ペメトレキセド (アリムタ®)	500mg/m2	10分	↓		

※アバスチンは初回投与が問題なければ、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能。

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。
-

CBDCA+PAC±BV 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
ベバシズマブ (アバスチン®)	15mg/kg	※90 分	↓		
カルボプラチナ (パラプラチナ®)	AUC6	60 分	↓		
パクリタキセル	200mg/m2	3 時間	↓		

※アバスチンは初回投与が問題なければ、2 回目は 60 分、3 回目以降は 30 分に短縮可能。

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。
-

CBDCA+nabPAC 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	21 日目
カルボプラチニン (パラプラチニン®)	AUC6	60 分	↓				
パクリタキセル アルブミン懸濁型 (アブラキサン®)	100mg/m2	30 分	↓	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。
-

CDDP+DOC 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	21日目
シスプラチニン (ランダ [®])	80mg/m2	90 分	↓		
ドセタキセル (タキソテール [®])	60mg/m2	60 分	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、腎機能障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

DOC+RAM 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】なし

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	21日目
ラムシルマブ (サイラムザ [®])	10mg/m2	60 分	↓		
ドセタキセル (タキソテール [®])	60mg/m2	60 分	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Nivolumab 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】14 日

【コース数】なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	14 日目
ニボルマブ (オプジー [®])	240mg/body	1 時間	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象(irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
-

Pembrolizumab 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
ペムブロリズマブ (キイトルーダ®)	200mg/body	30 分	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象(irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
-

Atezolizumab 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
アテゾリズマブ (テセントリク®)	1200mg/body	1 時間	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象(irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
-

Pembrolizumab+CBDCA+nabPAC 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	21 日目
ペムブロリズマブ (キイトルーダ®)	200mg/body	30 分	↓				
カルボプラチニン (パラプラチニン®)	AUC6	60 分	↓				
パクリタキセル アルブミン懸濁型 (アブラキサン®)	100mg/m2	30 分	↓	↓	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象 (irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
 - ・恶心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Pembrolizumab+CDDP+PEM 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	21日目
ペムブロリズマブ (キイトルーダ®)	200mg/body	30分	↓		
シスプラチニン (ランダ®)	75mg/kg	90分	↓		
ペメトレキセド (アリムタ®)	500mg/m ²	10分	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1型糖尿病などの免疫関連有害事象(irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
 - ・恶心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Pembrolizumab+CBDCA +PEM 療法

【癌種】非小細胞肺癌

【区分】進行再発

【1 コース期間】21 日

【コース数】4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	21日目
ペムブロリズマブ (キイトルーダ®)	200mg/body	30分	↓		
カルボプラチナ (パラプラチナ®)	AUC5	60分	↓		
ペメトレキセド (アリムタ®)	500mg/m2	10分	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1型糖尿病などの免疫関連有害事象(irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
- ・恶心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髓抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部
[TEL 098-932-1110](tel:098-932-1110) (代表)
FAX 098-923-2134 (薬剤部)