
DOC+PSL 療法

【癌種】 前立腺癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
ドセタキセル (タキソテール®)	75mg/m ²	60 分	↓		
プレドニゾン	10mg/day 1 日 2 回	連日内服	→		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Cabazitaxel 療法

- 【癌種】 前立腺癌
【区分】 進行再発
【1 コース期間】 21 日
【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
カバジタキセル (ジェブタナ®)	25mg/kg	60 分	↓		
プレドニゾロン	10mg/day 1 日 2 回	連日内服	→		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部
TEL 098-932-1110 (代表)
FAX 098-923-2134 (薬剤部)