
GC 療法

【癌種】 膀胱癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	2 日目	8 日目
ゲムシタビン (ジェムザール®)	1000mg/m ²	30 分	↓		↓
シスプラチン (ランダ®)	70mg/m ²	2 時間		↓	

薬剤名	15 日目	～	28 日目
ゲムシタビン (ジェムザール®)	↓		
シスプラチン (ランダ®)			

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

GCarbo 維持療法

【癌種】 膀胱癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
ゲムシタビン (ジェムザール®)	800mg/m ²	30 分	↓	↓	↓		
カルボプラチン (パラプラチン®)	AUC5	60 分	↓				

【注意点】

・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

M-VAC 療法

【癌種】 膀胱癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 2～6 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	2 日目	15 日目
メトトレキサート (メソトレキセート®)	30mg/m ²	30 分	↓		↓
ビンブラスチン (エクザール®)	3mg/m ²	5 分		↓	↓
ドキソルビシン (アドリアシン®)	30mg/m ²	5 分		↓	
シスプラチン (ランダ®)	70mg/m ²	2 時間		↓	

薬剤名	22 日目	～	28 日目
メトトレキサート (メソトレキセート®)	↓		
ビンブラスチン (エクザール®)	↓		
ドキソルビシン (アドリアシン®)			
シスプラチン (ランダ®)			

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

キイトルーダ療法

- 【癌種】 尿路上皮癌
【区分】 進行再発
【1 コース期間】 21 日
【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	28 日目
ペムプロリズマブ (キイトルーダ®)	200mg/body	30 分	↓		

【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象 (irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部
TEL 098-932-1110 (代表)
FAX 098-923-2134 (薬剤部)